

Rodilon® Pâte

Très appétent et sans concession pour tous les rongeurs



■ A base de diféthialone, anticoagulant monodose à large spectre d'actions

Élimine les infestations de souris, rats, lérots, loirs...

■ Grande appétence

Garantit une consommation privilégiée en des lieux où se trouvent d'autres sources de nourriture pour les rongeurs.

■ Haute efficacité

Rodenticide de dernière génération, résultats observables dès les premiers jours suivant l'application.



Dératisation tous types de bâtiments - Emballages de 5 kg et 2,5 kg en sachets de 10 g.

Rodilon : 0,0025% de diféthialone, classement toxicologique : Xn nocif. AMM N° 2010016. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette, respecter les conditions d'emploi.



Bayer Environmental Science

Dose d'appâtage

- *Contre les souris, loirs, lérots* : placer 1 sachet de 10 g de Rodilon® Pâte par poste d'appâtage.
- *Contre les rats* : placer 10 sachets de 10 g de Rodilon® Pâte par poste d'appâtage.
- Attendre 5 jours avant d'observer les premières consommations.
Remettre des sachets tant que cette consommation est observée.

Poste d'appâtage

- Placer chaque poste d'appâtage sur les lieux de passage des rongeurs ou le plus près possible de leurs nids.
- *Contre les souris, loirs, lérots* : placer un poste d'appâtage tous les 3 m en linéaire.
- *Contre les rats* : placer un poste d'appâtage tous les 10 m en linéaire.

Lieux d'appâtage

- Rodilon® Pâte peut être utilisé dans des conditions extrêmes (chaleur, humidité, moisissures, poussière). Il convient pour tous les intérieurs infestés, y compris les plus insalubres.
- Placer les sachets dans des boîtes à appât ou dans des lieux hors de portée des animaux domestiques.

Durée du traitement

- Une lutte complète contre les souris nécessite 4 à 6 semaines de traitement de suivi.
- Une dératisation complète nécessite 3 à 4 semaines de traitement suivi.

